

FEEDING CHART

แนะนำ

HAND DIRECT FEED

3-PART

ลำดับการผสม	หน่วย	ช่วงทำใบ			ช่วงทำดอก			ฟอส
		กิ่งชำ	สปีดาร์แรก	ทุกช่วงทำใบ	สปีดาร์ที่ 1 - 2	สปีดาร์ที่ 3 - 6	สปีดาร์ที่ 7 - 8 ขึ้นไป	
COREX (A)	กรัม / ลิตร	0.7	1	1	1	1		
ELDEX (B)	กรัม / ลิตร	0.7	1	1	1	1	1	
FLOREX (B)	กรัม / ลิตร	0.7	1	1	1	1	1	
FLO FADE	มล. / ลิตร						4	
AURORA	กรัม / ลิตร				0.5	1	0.5	
TERRA	กรัม / ลิตร	0.1	0.1	0.1				
OXY ROOT	มล. / ลิตร	0.5 - 1 มล. ตลอดช่วง						
MIRA UP	มล. / ลิตร	0.1 - 1 มล. ตลอดช่วง, ใช้เพิ่มค่า pH, ตรวจสอบค่า pH ตามเหมาะสม						
Target EC		1.8	2.8	2.8	3.2	3.7	2.5	
PPM 500		900	1400	1400	1600	1850	1250	
PPM 700		1260	1960	1960	2240	3330	1750	

พืชมทางใบ / สดทางดิน		ช่วงทำใบ
ลำดับการผสม	หน่วย	ทุกช่วง ทำใบ
TERRA	กรัม / ลิตร	0.1

ตรวจสอบค่า pH และค่า EC ทุกครั้ง
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการผสมปุ๋ย
ค่า pH ที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 5.5 - 6.5
ค่า pH ต่ำเกินไป:
1. ลดความเข้มข้นของปุ๋ยลงให้เหมาะสมกับน้ำที่ใช้
2. ใช้ **MIRA UP** เพื่อเพิ่มค่า pH
ค่า pH สูงเกินไป:
1. เพิ่มความเข้มข้นของปุ๋ย

ขั้นตอนการผสมผงลงน้ำโดยตรง

แนะนำ

ผสมโดยตรง (ชั่งน้ำหนักปุ๋ย)

ผสมปุ๋ยลงในถังพักปุ๋ยได้โดยตรงด้วยการชั่งน้ำหนักปุ๋ย เป็นวิธีใช้งานที่ง่ายที่สุดและพบได้ทั่วไป ใส่ปุ๋ยตามลำดับในตารางการให้ปุ๋ย โดยรอให้ปุ๋ยละลายจนหมดก่อนจึงใส่ปุ๋ยตัวถัดไป

การเก็บรักษาปุ๋ยผง/เม็ด/เกล็ด

ปุ๋ยควรเก็บให้พ้นจากความชื้น เพราะปุ๋ยสามารถดูดความชื้นได้เร็วและอาจทำให้ปุ๋ยเปียกชื้น แม้ว่าปุ๋ยที่เปียกชื้นจะยังสามารถใช้งานได้ แต่จะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น หากเกิดเหตุการณ์นี้ ควรตรวจสอบค่าความเข้มข้น EC อีกครั้งหลังการผสมปุ๋ยเพื่อให้แน่ใจในความแม่นยำ

3-PART

